

هیدر آدنیت چرکی یک بیماری مزمن

چرکی است که در زیر بغل، نواحی

مقعدی-تناسلی و زیر سینه خانم ها رخ

می دهد و باعث تولید بافت جوشگاه در

آن ناحیه می شود. این بیماری در زنان

شایعتر از مردان است بروزگروهی در

خانواده مشاهده می شود

هیدر آدنیت چرکی چه علایمی دارد

این بیماری به صورت یک جوش دردناک

تظاهر پیدا می کند و باعث التهاب وسیع

و عمیق پوست و جوشهای بزرگ و درد

ناک می شود و در نهایت در مکان های

گرفتار نوارهای طناب مانندی از بافت

جوشگاه به وجود می آید



هیدر آدنیت چگونه تشخیص داده می

شود

نمونه برداری از پوست انجام می گیرد که

انسداد غدد پوست مشاهده می شود

هیدر آدنیت چگونه درمان می شود

تزریق داخل ضایعه تریامسینولون برای

کیست های کوچک انجام می شود .

مصرف دراز مدت آنتی بیوتیکهای خوراکی

اساس درمان است .

استفاده از آنتی بیوتیکهای تزریقی

داروهای ضد بارداری خوراکی گاه

مفید واقع می شوند

خارج کردن ضایعات از طریق جراحی

غالباً تنها راه حل است .

از بین بردن موها توسط لیزر ممکن

است مفید باشد.

ضد تعریق های موضعی و پودری

اصطکاک و سایش را کم می کند

در بیماری هیدر آدنیت چه مواردی را

باید بدانیم

هیدرآدنیت به مدت ۱۹ سال فعال

است

بیماران ممکن است پیش از قاعدگی

دچار شعله وری بیماری شوند

بیماری بعد از یائسگی فروکش می

کند

دانش خود را در مورد بیماری هیدرآدنیت افزایش

دهید.



کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

آدرس: خیابان وحدت اسلامی، میدان وحدت

اسلامی، بیمارستان تخصصی پوست رازی

تلفن: 55630174-55630223-55630853-
55631465

تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:

55609951-3

55696705-8

55630668-9

۵۵۶۳۰۶۶۵

پیامک: ۳۰۰۰۲۴۰

نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir

ایمیل: razihospital@sina.tums.ac.ir

بارداری و شیردهی ممکن است باعث

فروکش نمودن بیماری شوند

چاقی، لباس های تنگ و سیگار کشیدن

باعث تشدید هیدرآدنیت می شود

بیماران مبتلابه زخم های مزمن در

معرض خطر سرطانهای پوستی هستند

هیدرآدنیت در بچه ها و کسانی که چاق

نیستند نیز دیده می شود

بیماری دور مقعد پیش آگهی بدتری

دارد

منابع

۱- تشخیص و درمان بیماری های

پوست هیف ترجمه دکتر بلیغی و دکتر

سبجانیان

۲- تشخیص و درمان بیماری های

پوست هیف جیمز کمپیل شین چاپمن

ویرایش سوم