



بیمارستان فوق تخصصی
پوست رازی

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات درمانی تهران

هپاتیت B



کمیته آموزش پرستاری و پزشکی
بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

آدرس بیمارستان:

خیابان وحدت اسلامی - میدان وحدت اسلامی بیمارستان پوست
رازی
تلفن: 55609951
تلفکس: 55620300

وب سایت:

www.razihospital@tums.ac.ir
www.tums.ac.ir/razi

توصیه های ضروری



- کسانی که سابقه هپاتیت داشته و یا یک فرد آلوده به هپاتیت B در خانواده دارند ، نباید خون اهدا کنند و ابتدا باید با آزمایش HBS Ag وضعیت خون خود را مشخص کنند.
- حداقل تا 12 سال پس از تزریق واکسن هپاتیت B و ایجاد آنتی بادی ضد HBS نیاز به تزریق دوز یادآور نیست. برای تاثیر بهتر واکسن هپاتیت B، استعمال دخانیات را ترک کنید.
- تزریق واکسن هپاتیت B در دوران بارداری بلامانع است و هیچ اثر سوئی بر مادر و جنین ندارد.
- ازدواج برای ناقلین هپاتیت B بلامانع است.
- ویروس هپاتیت B علاوه بر خون در تمام ترشحات بدن از جمله مایع منی، ترشحات واژن، بزاق و اشک وجود دارد.

منبع:

اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها-
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
درسنامه پرستاری داخلی و جراحی-برونر
و سوارث

هپاتیت B چیست؟

هپاتیت یعنی التهاب و ورم کبد که به آن یرقان نیز می گویند یکی از عوامل ایجاد کننده آن ویروسها هستند.

علامت و نشانه های هپاتیت B چیست؟

سرماخوردگی و حالت آنفولانزا ، بی اشتها بی ضعف و بیحالی احساس کسالت و تیره رنگ شدن ادرار و کم رنگ شدن مدفوع ، خارش و سر درد تایک حالت یرقان شدید متغیر است .به این حالت هپاتیت حاد گفته می شود.گاهی اوقات بیماری کاملاً بدون علامت می باشد.



چه کسی

بیماری هپاتیت B است؟

ناقل بیماری هپاتیت به کسانی گفته میشود که آزمایش آنتی ژن هپاتیت B در خون بیمار مثبت باشد، حال عمومی خوبی داشته باشد و در بررسی آزمایشگاهی اختلالی در کار کبد آنها مشاهده نشود. در چنین شرایطی ویروس به کبد آسیب نمی رساند .بایستی این افراد بصورت دوره ای معاینه شوند. زیرا خطر فعال شدن ویروس و آسیب کبدی وجود دارد.

راههای انتقال ویروس هپاتیت B

1- از طریق مادر آلوده به نوزادان

2- تماس جنسی با فرد ناقل یا مبتلا هپاتیت

3- کارمندان بیمارستانها که در تماس نزدیک با بیماران هستند که احتمال تماس با ترشح یا خون بیمار وجود دارد.

4- استفاده از خون و فرآورده های خونی آلوده

5- استفاده از وسایل غیر استریل در دندانپزشکی ، استفاده از سرنگهای مشترک در معتادین تزریقی ، سوراخ کردن غیر بهداشتی گوش ، خالکوبی و حجامت



تماسهای عادی و روزمره نظیر دست دادن ، در یک اطاق کار کردن ، معاشرت با دوستان خطر انتقال بیماری را ندارد.

شیوه استفاده از واکسن

تزریق واکسن هپاتیت B در سه نوبت (اولین مراجعه- 1 ماه بعد- 6 ماه بعد) تا

95% موارد به ایجاد آنتی بادی ضد

HBS و در واقع ایمن شدن فرد منجر می

شود توصیه می شود آنتی بادی ضد HBS

تا یک تا سه ماه بعد از کامل شدن نوبت

های تزریق واکسن اندازه گیری شود.



افرادی که جزء گروه پرخطر هستند،

3-1 ماه بعد از دریافت آخرین دوز واکسن

، تیتراژ آنتی بادی آنها کنترل و در صورتی

که کمتر از 10 باشد، یک دوره کامل

واکسیناسیون (3 نوبت) مجدد دریافت

نمایند.

جهت پیشگیری از ابتلای نوزاد به

هپاتیت B :

1- تزریق واکسن و ایمونوگلوبولین اختصاصی

2- شیردهی مادران ناقل هپاتیت B به نوزادان

بلامانع است.