

# تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

حیوانات با گزیده شدن توسط کنه آلوده، مبتلا می شوند. عامل ایجاد کننده بیماری ویروس می باشد. این ویروس ها نسبت به خشک شدن و حرارت، حساسند و در خون خشک شده، گوشت پخته و  $PH < 6$  حیات خود را از دست می دهند.



## ➤ راه انتقال بیماری :

- گزش کنه
- لاشه حیوان - خون و ترشحات حیوان آلوده
- تماس با خون و بافت های بیمار مبتلا

## ➤ علائم بیماری :

تب ناگهانی، بدن درد، کوفتگی، ضعف، سردرد، درد شدید عضلات، بی اشتها، درد پشت حلقه چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلودرد و دل درد

تغییرات خلقی مثل بیقراری و افسردگی

علائم خونریزی از روز ۳ تا ۶ شروع میشود.



## ➤ پیشگیری

- روش های حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و خون حیوان (پوشیدت دستکش، لباس بلند، چکمه، ماسک و عینک)
- روش های حفاظت شخصی از گزش کنه و حشرات
- خودداری از رفت و آمد در محلهای کشتار غیر مجاز
- اجتناب از خوردن جگر خام و نیم پخته، نگهداری جگر، قلب، کلیه به مدت ۴۸ ساعت در یخچال و سپس استفاده از آن

- جدا نگاه داشتن جایگاه دام از محل زندگی
- خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام
- خودداری از تماس بدن با ترشحات و خون دام
- خودداری از کشتار دام در محلهای غیر مجاز
- تهیه گوشت مورد نیاز از محلهای مطمئن و تحت نظارت دامپزشکی
- نگهداری گوشت تازه به مدت 24 ساعت در یخچال و سپس استفاده
- رعایت اصول ایمنی در موقع تماس با گوشت تازه، جگرو سایر آلاینده های دام