


آزمایشگاه بیمارستان رازی

## دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع



## دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع

رایج‌ترین کاربرد آزمایش مدفوع، تشخیص انواع مختلف انگل‌های بیماری‌زا در روده است

افرادی که تحت آزمایش مدفوع قرار می‌گیرند، باید برای مدت ۷ تا ۱۰ روز پیش از انجام این

آزمایش از درمان با روغن کرچک یا روغن‌های معدنی، بیسموت، منیزیم، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه

با باریوم و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها خودداری نمایند

بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود

نمونه مدفوع باید مستقیماً در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار می‌گیرد جمع‌آوری شود

اگر بیمار بستری است، نمونه را در یک ظرف خشک جمع‌آوری نموده و سپس با استفاده از چوب

مخصوص (آبسلانگ)، نمونه را به ظرف نگهدارنده برچسب دار منتقل نمایید

نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده گردد زیرا ادرار می‌تواند برخی از انگل‌های فعال را از بین ببرد

بیماران باید نمونه جمع‌آوری شده را خصوصاً در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه

ارسال کنند

اگر انجام آزمایش حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از جمع‌آوری نمونه امکان‌پذیر نباشد، لازم است تا نمونه

در یخچال قرار داده شود